

Psoriasis y Adalimumab

N.Bastos, F.Villar, M.Duarte, N.Raimondo M.Baltierrez, D. Diaz Mundaca, V.Coassolo, L.Campos, F.Garrido

Paciente de sexo masculino de 67 años, con diagnóstico de psoriasis de 15 años de evolución.

Acude a la consulta en Enero 2007 con Psoriasis en región umbilical, codos, una placa en dorso, y un mayor compromiso en cuero cabelludo

Se indica tto local con Daivonex + Clobetasol + Sorsis shampoo

Noviembre 2008: Presenta Psoriasis extendida

Estuvo en tto con Metotrexato

5 de Diciembre 2008

Paciente Eritrodérmico, mal estado gral

Lab: Urea 29, Creat 1,07; TGO 25 TGO 18; FAL 210 Colest. 215 Trigl 134; HDL 47 LDL 141



Peso: 77 kg alt 1.75; P.abd 109 cm

Alcohol 1. ½ lt vino

Tto: Deltisona B 20 mg/d +

Celestone crono 12 2 mg +
protección gástrica

Se sugiere internación

23/12/08 Rebrote Pustuloso

Col 175 Trigl 105 **Gluc 123**

Tto Deltisona B 14 mg

Neotigason 50 mg/día

Marzo 09 Col 213 TG 229. Se
suspende Neotigason

Junio 2009 Inicia tto con Adalimumab

Octubre 2009 3 meses de tto:

Paciente sin lesiones

Lab.: **ESD 40; F.Reumatoideo 14;**

PCReactiva 0,75; Creatinina 1.36

Abril 2010 Termina tto con Adalimumab

El paciente comienza con Hemóptisis

Sobrino en tto por TBC

Dx: TBC

Obito del paciente

